

Guida alla vaccinazione antinfluenzale con Fluenz Tetra

Gentile genitore,

se tuo figlio ha un'età compresa tra 2 e 18 anni, la vaccinazione antinfluenzale in Lombardia viene offerta gratuitamente e il vaccino previsto per questa fascia di età è Fluenz Tetra.

Fluenz Tetra è un vaccino per la prevenzione dell'influenza autorizzato in Europa nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 24 mesi e 18 anni. È un vaccino che si somministra come uno spray nasale, senza uso degli aghi.

Questo vaccino è utilizzato da diversi anni in USA, in UK e in altri Stati europei (ad es Finlandia, Irlanda).

È un vaccino vivo attenuato quadrivalente, che protegge per 4 ceppi influenzali, con una efficacia molto alta su tutti i ceppi contenuti.

Cosa sapere prima che venga somministrato Fluenz Tetra

Fluenz Tetra **non deve essere somministrato se suo figlio:**

- ha avuto una grave reazione allergica (shock anafilattico) alle uova o alle proteine dell'uovo;
- è allergico in modo grave alla gentamicina, alla gelatina o ad uno qualsiasi degli altri componenti inclusi nel vaccino;
- ha una malattia del sangue o una malattia oncologica a carico del sistema immunitario;
- ha una **grave forma di immunodepressione** o è in terapia con corticosteroidi ad alte dosi;
- sta assumendo **in modo continuativo** acido acetilsalicilico*
- soffre di un grave forma di asma (asma attiva) o respiro sibilante attivo oppure se ha avuto un aggravamento dell'asma nelle 72 ore precedenti la vaccinazione

Fluenz Tetra **può essere utilizzato in sicurezza** in bambini e ragazzi:

- con infezione da HIV asintomatica;
- con asma lieve o moderata ben compensata
- che stanno ricevendo corticosteroidi topici/inalatori o corticosteroidi sistemici a basso dosaggio o in caso di terapia con corticosteroidi come terapia sostitutiva (es.: per insufficienza surrenalica).

Effetti collaterali dopo la vaccinazione

Dopo la vaccinazione, nelle prime 24-48 ore, tuo figlio potrebbe avere uno o più di questi sintomi:

- Febbre
- Dolori muscolari (mialgie)
- Diminuzione/perdita di appetito
- Mal di testa
- Congestione nasale

Questi sintomi si risolvono di norma spontaneamente. In caso di febbre, è possibile intervenire con un normale antipiretico nel dosaggio idoneo all'età e al peso del soggetto. Nel caso in cui bambino/ragazzo manifestasse sintomi di maggior gravità, contattare il proprio pediatra di fiducia.

Altre avvertenze e precauzioni per l'uso di Fluenz Tetra

I soggetti vaccinati, per 1-2 settimane dopo la vaccinazione, dovrebbero evitare contatti stretti con individui gravemente immunocompromessi (ad esempio, i riceventi di trapianto di midollo osseo che richiedono isolamento). Se il bambino sta assumendo un farmaco antivirale, deve sospenderlo e attendere almeno 48 ore prima di essere vaccinato. Anche nelle 2 settimane successive alla vaccinazione il bambino non dovrebbe assumere farmaci antivirali.



Se inquadra con il suo smartphone questo QRCode, potrà vedere il video ufficiale del Ministero della Sanità Irlandese che mostra la modalità di vaccinazione con Fluenz tetra.

(<https://youtu.be/89N1Yf9svRk>)